

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 88.35.55

ABONNEMENT ANNUEL

50 F.

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN N° 90 - 11 Août 1977

VIGNE

MILDIOU

Le traitement préconisé le 29 Juillet est maintenant en fin d'efficacité et un renouvellement général s'impose.

On ne trouve actuellement que peu de parcelles indemnes de maladie. L'étendue des attaques est très variable. Les vignes négligées et précocement atteintes sont en grande partie défeuillées, dans les autres où les contaminations sont plus récentes et touchent surtout les dernières feuilles sorties, il convient de limiter la maladie par un rognage et en effectuant les traitements avec un maximum de soin (renouvellement en fonction des pluies notamment).

Du fait des attaques fréquentes sur grappes (rot gris, rot brun), il est conseillé de préférer les poudrages qui assurent une meilleure répartition du produit et ainsi une meilleure protection (notamment au niveau de la rafle).

BOTRYTIS

S'il n'a été fait, effectuer d'urgence le deuxième traitement botrytis avant la fermeture de la grappe.

OIDIUM

On note la présence d'oidium sur grappe dans de nombreuses parcelles, où il est conseillé d'intervenir par soufrages (qui ont une action non négligeable sur les acariens).

VER de la GRAPPE

Les captures sont très faibles et aucun dégât notable ne nous est signalé.

ARAIGNEE JAUNE et ACARIOSE

Des foyers nous ont été signalés, il convient de surveiller leur extension. Attendre un prochain avis.

POMMIERS - POIRIERS

CARPOCAPSE

Le deuxième vol débute actuellement dans les Charentes, mais il sera vraisemblablement peu dangereux en raison des attaques avant début Juillet. En prévision d'éclosion des oeufs à partir du 20 Août on pourra envisager une protection insecticide à cette date.

Pour les autres régions, le deuxième vol sera pratiquement inexistant et sauf avis contraire avant le 30 Août, aucun traitement n'est utile.

ARAIGNEE ROUGE :

Dans les vergers contaminés on assiste actuellement au début du dépôt des oeufs d'hiver. En cas de fortes infestations on pourra lutter contre ce ravageur et empêcher ainsi le dépôt des pontes avec les produits suivants :

- dicofol (nbs spécial.) 50 g. m.a./hl actif sur oeufs, larves et adultes
- tetradifon (+ prothoate = Tedion extra) (+ dicofol = Kelthion)
- cyhexatin (Plictran - Mitacid) 30 g m.a./hl - actif sur adultes
- benzoximate (Artaban) 30 g m.a./hl actif sur oeufs, larves et adultes.

Notons que le soin apporté à l'application est très important.

TAVELURE

Dans les vergers atteints, assurer la protection en fonction des pluies.

TABAC

MILDIOU

De nombreux foyers sont présents dans toute la région.

Assurer soigneusement la protection.

P/ Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"POITOU-CHARENTES" p.o.

L'Ingénieur d' Agronomie :

G. LECHAPT

Imprimé à la Station le 14 Août 1977 - Précédente Note : Bulletin N° 89 - 29.7.77

N° du papier de presse : 535 AD .